

Sommaire

[Données météo](#) [P2](#)

[Colza](#) [P2/P4](#)

[Blé et orge](#) [P5](#)

Légende :



Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



	Indicateurs de risque	L'essentiel
Stades du colza :		les parcelles sont majoritairement au stade D2 : boutons accolés visibles. Les stades observés sont ceux des variétés d'intérêts. Les variétés à floraison précoce qui y sont associées ne sont et ne doivent pas être prises en compte.
Charançon de la tige du colza		Les premiers charançons sont arrivés. Le vol va perdurer.
Risque colza sain		Le méligèthe s'est généralisé dans la totalité des parcelles du réseau et en quantité assez importante. Le risque est assez variable en fonction de l'état sanitaire de la culture, du stade du colza et de la présence plus ou moins significative en méligèthe. Il est impératif d'évaluer sa parcelle.
Méligèthe		
Risque colza fragile		
Blé et orge : Les deux cultures sont majoritairement en fin tallage. Certaines parcelles sont déjà à épi 1cm, voire dépassé, en particulier en semis précoce et au vu des remontées exceptionnelles des températures.		

LES ACTUALITES DU MOMENT

ACTU REGLEMENTAIRE : floraison démarre et les abeilles butinent. Protégeons-les !!

La réglementation a évolué pour la protection des insectes pollinisateurs.

[Pour plus de détails sur ce changement pour les applications durant la floraison, cliquez-ici](#)




ACTU TECHNIQUE :

Surveiller l'arrivée du stade épi 1cm :

un stade clé pour de nombreux paramètres.

Le stade « épi 1 cm » est atteint lorsque la distance entre le sommet de l'épi et le plateau de tallage est, en moyenne, de 1 cm sur le maître-brin (figure ci-contre). A partir de ce stade les maladies comme le piétin-verse sur blé et la rhynchosporiose sur orge, ainsi que l'oïdium doivent être suivies pour en évaluer le risque.

Pour en savoir plus : [Arvalis, reconnaître le stade épi « 1 cm »](#). [cliquez-ici](#)



ACTU BIODIVERSITE:

Ces notes Biodiversité mettent en avant les pratiques agricoles concourant au maintien ou à l'amélioration de la biodiversité.



Données météo

[Retour](#)
[sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C janvier (Normales)	Températures moyennes en °C février (Normales)	Précipitations Cumul en mm janvier (Normales)	Précipitations Cumul en mm février (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	6.7 (6.2)	9.9 (6.5)	118.8 (66.6)	104.0 (51.6)
	Miniac-Morvan	6.7 (6.2)	9.9 (6.5)	100 (66.6)	163.8 (51.6)
	Langon	6.3 (6.2)	9.7 (6.5)	174.6 (66.6)	158.8 (51.6)
Finistère	Brest	7.1 (7.1)	9.9 (7.1)	317.4 (142.6)	201.8 (118.7)
	Landivisiau	6.9 (7.1)	9.6 (7.1)	252.2 (142.6)	165.4 (118.7)
	Quimper	7.3 (7.1)	10.1 (7.1)	351 (142.6)	244.9 (118.7)
Morbihan	St-Avé	7.1 (6.8)	9.9 (7.1)	156.6 (109)	164.6 (82.5)
	Neulliac	6.4 (6.8)	9.8 (7.1)	259.6 (109)	196.4 (82.5)
	Taupont	7.2 (6.8)	10.3 (7.1)	167.7 (109)	136.2 (82.5)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	6.8 (6.3)	9.8 (6.5)	150 (74.2)	130.4 (64.5)
	Louargat	5.8 (6.3)	8.9 (6.5)	182.2 (74.2)	130.8 (64.5)
	St Glen	6.3 (6.3)	9.4 (6.5)	206.6 (74.2)	168.2 (64.5)

Données météo, du 1^{er} janvier et le 28 février 2026 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Commentaire : Un mois de février très excédentaire en pluie et bien au-dessus des normales de températures.



Les températures printanières devraient se maintenir jusqu'à jeudi. Une légère baisse des températures sera attendue par la suite mais elles resteront au-dessus des normales. Quelques épisodes de pluies sont prévus pour la fin de semaine. Globalement les conditions climatiques sont très favorables au développement des cultures.

Colza

Stades

30 parcelles ont été suivies pour la période du 26/02 au 03/03 (semaine 10).

Elles sont majoritairement au stades D2 : boutons accolés visibles.



Carte 1 : Stades du colza observés entre 26/02 et le 03/03 (semaine 10).

Graphique 1 : stades des parcelles de colza du réseau.



Le méléigèthe (*Meligethes aeneus*)

• Observation issues des parcelles du réseau

Les observations sont faites sur le colza d'intérêt et non sur la variété à floraison précoce qui lui a été associée.

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Nb parcelles stades D1-D2 et infestées	% moyen de plantes infestées	Nb moyen de Méléigèthes /plante	Nb parcelles stades E et infestées	% moyen de plantes infestées	Nb moyen de Méléigèthes /plante
26/02 au 03/03	29	18	62	10	8	67	4
19/02 au 24/02	25	1	5	1	0	0	0

• Analyse de risque et prévisions

Le méléigèthe s'est généralisé dans la totalité des parcelles et en quantité assez importante. Le risque est assez variable en fonction de l'état sanitaire de la culture, du stade du colza et de la présence plus ou moins significative en méléigèthe.

Plus globalement pour les colzas en situation de fragilité le seuil est dépassé.

Pour les colzas sains, le risque est plus modéré notamment si la floraison arrive dans les prochains jours.

Si infestation significative et colza sain. Risque :  **moyen.**

Si infestations significatives et colza fragile. Risque :  **fort**

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Le risque est à évaluer sur le colza d'intérêt au cœur de la parcelle, en prenant en compte son état, son stade et le niveau d'infestation. **Une fois les premières fleurs ouvertes il n'y a plus de risque.**

Etat du colza	Stade D1 (boutons accolés)	Stade E (boutons séparés)
Colza sain et vigoureux, conditions pédo-climatiques favorables aux compensations	Aucun risque	6 - 9 méléigèthes/ plante*
Colza peu développé et/ou situé en conditions défavorables aux compensations (parcelles ou zones hydromorphes, peuplement trop faible ou trop important, vigueur faible des plantes,).	50% de plantes infestées ou 1 méléigèthe/plante*	65% à 75% de plantes infestées ou 2 - 3 méléigèthes/ plante*

*Le comptage en bordure n'est pas représentatif de la situation, tout comme le dénombrement des méléigèthes piégés dans la cuvette jaune. Ces deux observations ne sont que des indicateurs permettant de détecter l'arrivée du ravageur dans la parcelle. (Textes et photos. Source : Terres Inovia).



Photo : méléigèthes sur boutons (Stade E)



Photo : boutons avortés suite attaque méléigèthe

• Informations sur le ravageur

Le méléigèthe est un petit coléoptère de couleur noir brillant. **La période à risque pour le colza est du stade D1 (boutons accolés cachés) à E (boutons séparés) car le ravageur va percer les boutons floraux pour se nourrir du nectar (cf. photo à droite).** Il est en général peu nuisible. Leur vol se déclenche lorsque les températures sont >14° C.

A partir de la floraison, il n'est plus considéré comme un ravageur mais comme un pollinisateur. (Texte et photo. Source : Terres Inovia).

Pour plus de détails sur le ravageur, consultez sa fiche sur le site de Terres-Inovia. [Fiche méléigèthe](#)






Le charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)


Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb pièges suivis	Nb parcelles dans la période de risque (C2-E)	nb pièges avec présence
Du 26/02 au 03/03	29	29	13
Du 19/02 au 24/02	25	25	0

Résultats des piégeages : Le charançon de la tige du colza a été capturé dans treize parcelles, principalement dans les zones sud de la région.



Carte 2 : Captures du charançon de la tige du colza observées entre le 26/02 et le 03/03 (semaine 10).



Graphique 2 : Dynamique de capture du charançon de la tige du colza.

Analyse de risque et prévisions

Comme attendu, la hausse des températures ($> 9^{\circ}\text{C}$) a entraîné le vol du charançon de la tige du colza.

Il est pour le moment principalement observé dans le sud de la région. Les conditions climatiques favorables ($T^{\circ} > 9^{\circ}\text{C}$, absence d'intempérie) vont se maintenir, le vol devrait donc continuer. Les captures de la prochaine semaine confirmeront si le vol actuel est significatif ou non.

Risque global : faible à moyen

Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :


Du stade C2 (entre-nœuds visibles) à E (boutons séparés)



La gestion du risque doit se faire uniquement si le ravageur a été détecté par l'intermédiaire de la cuvette jaune et/ou par les symptômes qu'il provoque (déformation/éclatement de la tige-cf photo).

Si la présence du ravageur est avérée, sa gestion doit se faire au début de l'élongation de la tige, 8 jours après des vols significatifs.

Pour vous aider dans la gestion du risque, un Outil d'Aide à la Décision (OAD), a été créé par Terres Inovia. Il permet de vérifier si un vol va se déclencher près de votre commune. Cliquez sur l'icône à droite ou retrouvez l'OAD sur le site de Terres-inovia.



Informations sur le ravageur



Il ne faut pas confondre le charançon de la tige du colza avec celui de la tige du chou, ce dernier n'étant impactant pour la culture. Plus de détails dans [le BSV n° 3 du 25 février 2025](#)

Blé tendre d'hiver

[Retour sommaire](#)


Stades

29 parcelles de blé tendre d'hiver ont été observées entre le 26 février et le 3 mars 2026. Les parcelles sont majoritairement en fin tallage. La hauteur moyenne de l'épi est de 8mm





Carte 4 : Stades du blé tendre d'hiver observés entre 26/02 et le 03/03 (semaine 10).

Graphique 3 : stades des parcelles de blé tendre d'hiver

Orge d'hiver

Stades

22 parcelles d'orge d'hiver ont été observées entre le 26 février et le 3 mars 2026. Les parcelles sont majoritairement en fin tallage. La hauteur moyenne de l'épi est de 7mm



Carte 5 : Stades de l'orge d'hiver observés entre 26/02 et le 03/03 (semaine 10).

Graphique 4 : stades des parcelles d'orge d'hiver du réseau

PROCHAIN BSV : LE 10 MARS 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
AGRIAL, ARVALIS, CRA BRETAGNE, COOP GARUN-PAYSANNE, EAS, EUREDEN, FREDON BRETAGNE, HAUTOIS SAS.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Françoise MAHEO. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 63

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :

La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>

La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>

La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

Pour recevoir gratuitement les BSV : inscrivez-vous sur le site de FREDON Bretagne : [Formulaire d'inscription](#)
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [Formulaire pour envoi de mail](#).