

Bulletin de Santé du Végétal des Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI)

LA SANTÉ DES JARDINS ET ESPACES VERTS

N°8– 25/09/2026

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Retrouvez gratuitement les
BSV sur le site de la [DRAAF
Bretagne](#)

Retrouvez gratuitement le
BSV JEVI sur le site de la
[FREDON Bretagne](#)

A RETENIR :

ACTUALITÉS :

Vous trouverez sur [cette page en téléchargement](#), une note biodiversité sur l'importance des trogues.



A SURVEILLER ...:

- Découverte d'un nouveau thrips en Bretagne: Scirtothrips inermis
- Tigre de la vipérine: Présence sur la pointe Finistérienne!
- Processionnaire du pin: Premiers nids d'hiver observés
- Cicadelle verte toujours très active

Retrouvez l'ensemble des bulletins parus [sur notre site](#).

REJOIGNEZ LE RÉSEAU D'OBSERVATEURS BSV JEVI

Le contenu des Bulletins de santé du végétal (BSV) est basé sur les informations biologiques et épidémiologiques issues d'un réseau d'observateurs formés et accompagnés par un animateur régional, rédacteur du BSV. Plus les observateurs sont nombreux et bien répartis sur le territoire, plus le BSV donne une image précise et fiable de la santé des végétaux dans les différents espaces végétalisés (parcs et jardins publics, jardins historiques, terrains de sport, infrastructures, serres de collection, jardins privés, etc.).

Rejoignez le réseau de votre région et participez à l'enrichissement des BSV tout en renforçant vos connaissances en santé et protection des végétaux !

Contact: julien.kervella@fredon-bretagne.com

Identifiez les cibles de produits de biocontrôles grâce à ce logo



Identifiez les résistances de bioagresseurs à des produits phytopharmaceutiques (PPP)





SOMMAIRE

Ravageurs.....P3

Pucerons

Tigre de la vipérine

Processionnaire du chêne

Processionnaire du pin

Carpocapse du pommier

Frelon asiatique

Pyrale du buis

Scirtothrips inermis

Cicadelle verte

Plantes Exotiques Envahissantes.....P10

Ambrosie à feuille d'armoise

Auxiliaires.....P12

Financé par



Pucerons

On retrouve toujours des pucerons sur différents végétaux sans observer de foyers très développés. Les végétaux concernés sont: pommier, cerisier, poirier, tulipier, noisetier, choisya.

Méthode de lutte:

- Destruction manuelle par suppression des colonies par écrasement.
- Lutte biologique : différents auxiliaires se nourrissent de ces bioagresseurs, comme les oiseaux, les coccinelles, les chrysopes, les punaises prédatrices, les carabes, les cécidomyies, les syrphes, les hyménoptères parasitoïdes, les mammifères insectivores (ex : musaraigne) - Des photos de ces différents auxiliaires viendront illustrer cette liste tout au long de la saison. Favoriser leur implantation dans votre jardin permettra d'assurer une régulation efficace. Selon les auxiliaires, des lâchers peuvent également être effectués.
- Produits de biocontrôle homologués en jardins d'amateurs pour pucerons, à base de ces substances actives : acides gras, acides gras+soufre, huile de colza, huile de paraffine, huile essentielle d'orange, pyréthrin (attention : non sélectif).

Tigre de la vipérine: *Dictyla indigena*

Ce tigre, découvert en France pour la première fois en 2019 sur l'île de Bréhat (Côtes d'Armor), a été signalé pour la première fois sur le continent sur la commune de Ploubazlanec, distante d'environ 2 km de l'île, en juin 2023. En 2024, il est découvert à Saint Quay Portrieux, et à Plérin communes se situant respectivement à 20 kms et 35 kms au Sud Est de Ploubazlanec. Ce mois-ci il a été observé à Lézardrieux (commune proche de Bréhat) mais également à la pointe du Finistère sur la commune de Plougastel Daoulas. La progression de ce ravageur est donc très rapide. Il est important de bien observer vos plants, boutures, si vous en achetez ou si vous êtes amenés à réaliser des déplacements avec ceux-ci.



Larves de tigre de la vipérine
(Photo: FREDON Bretagne)



Dégâts sur feuille
(Photo: FREDON Bretagne)

Financé par

Processionnaire du chêne: *Thaumetopoea processionea*

Cette espèce va dorénavant passer l'hiver sous forme d'œufs limitant le risque d'urtication mais, ce risque n'est pas nul pour autant, on peut retrouver des nids restant collés à l'écorce. Ceux-ci sont remplis de poils urticants. Il est donc très important de rester vigilant et de porter les EPI adéquats pour une éventuelle manipulation.

LES BONNES PRATIQUES POUR ÉLIMINER LES NIDS DE NYMPHOSE:

- ♦ Avant toute manipulation, bien se protéger tout le corps en s'équipant d'une combinaison, d'un masque, de lunettes et de gants. Les poils urticants sont très volatiles.
- ♦ Préférer une intervention le matin par temps humide;
- ♦ Pulvériser abondamment une solution d'eau savonneuse sur le nid de nymphe;
- ♦ Retirer le nid humide et le placer dans un sac plastique étanche et bien fermé;

LES BONNES PRATIQUES POUR ÉVITER LES URTICATIONS:

En cas de pullulations dans les secteurs forestiers :


- ♦ S'équiper de manches longues, d'un pantalon et de chaussures montantes;
- ♦ Eviter de rentrer dans les massifs forestiers par fortes chaleurs et vents soutenus;

Un réseau de piégeage des adultes a été mis en place dans les communes suivantes: Quimper, Plougastel-Daoulas (29), Saint Alban, Plémet, Ploufragan, Saint Julien, Plumaudan, Languieux, Plélo, Plérin (22), Serent, Saint Avé, Sarzeau (56), Liffré, Iffendic, Saint Jacques de la Lande (35).

Le vol est désormais terminé. Les premiers papillons ont été piégés fin juin. Les captures sont restées faibles comparativement au nombre de nids que nous avons pu observer au printemps. Les températures très élevées que nous avons subi ont peut-être été fatales aux nymphes qui se situaient dans les nids sur les troncs et charpentières des chênes. Au total 107 papillons ont été relevés dans les pièges dont 82 sur la commune de Saint Alban dans les Côtes d'Armor.



Nid de nymphe collé à un tronc, rempli d'exuvies et de poils urticants
(Photo: M. Le Péchoux)



Financé par

Processionnaire du pin: *Thaumetopoea pityocampa*

Le vol de papillon de processionnaire du pin est désormais terminé. Le risque d'urtication est faible en ce moment. Les papillons ont pondu sur les aiguilles de pin. Les chenilles ont émergé et les premiers nids d'hiver ont été observés cette semaine dans les Côtes d'Armor.

Un réseau de piégeage des adultes a été mis en place dans les communes suivantes: Quimper, Argol, Le Faou, Guipavas, Landerneau, Morlaix (29), Taden, Ploufragan, Ploëuc du Trioux, Pléhédel, Saint Agathon, Pleumeur Gautier, Lézardrieux, Yffiniac, Tréfumel (22), Serent, Sarzeau, Pluneret (56), Liffre (centre ville) Liffre (forêt), Iffendic, Saint Jacques de la Lande (35). Les premiers papillons ont été piégés en semaine 26. Le pic de vol a été enregistré en semaine 29, ce qui est précoce cette année. Ce phénomène est sûrement dû aux températures excessives. Nous sommes sur une année à pression élevée car la moyenne de papillons capturés par pièges s'élève à 49 (cf histogramme). La zone de colonisation de la processionnaire du pin s'accroît car pour la première fois, nous avons capturé début juillet, des papillons à Morlaix dans le Finistère.



Premiers nids d'hiver

(Photo: FDGDON 22)

Méthode de lutte:

En cette période estivale, les méthodes de luttes à mettre en place sont:

- ♦ Mise en place de pièges à phéromones pour capturer les papillons mâles (à installer mi juin jusqu'à mi septembre).
- ♦ Récupérer et éliminer les nids d'hiver tombés au sol (avec les EPI nécessaires).


Pour plus d'informations, consultez le recueil des méthodes de lutte de l'observatoire des chenilles processionnaires en cliquant [ICI](#).

en cliquant [ICI](#).

Nombre total de captures de papillons de processionnaires du pin en Bretagne en 2026



Moyennes de papillons capturés par piège par an



Financé par


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
*Liberté
Égalité
Fraternité*


Carpocapse du pommier

Des dégâts ont été observés en juillet et août sur les fruits avec parfois des niveaux d'infestation assez élevés suivant les vergers.

Un réseau de piégeage a été mis en place sur différents sites: Plougastel-Daoulas x2, Plabennec, Quimper x2, Combrit, Plougoulm (29), Theix Noyal, Guidel (56), Betton, Saint Grégoire, Pleurtuit et Saint Meen le Grand (35). Les premiers papillons ont été piégés au début du mois de mai, un pic de vol est enregistré fin mai avec 56 papillons piégés. Le vol a perduré tout le mois de juin et en juillet sans enregistrer de cumuls importants. Un deuxième pic de vol est enregistré mi août. Celui-ci est plus marqué que celui du mois de mai (voir graphique). Les vols sont dorénavant terminés. Le cumul le plus important de papillons capturés se situe à Quimper dans un jardin de particulier avec 94 papillons.

En début de premier vol, les mâles sortent avant les femelles (protandrie) et après accouplement, la ponte ne se fait que sur feuillage sec et si les conditions de températures crépusculaires sont favorables ($>15^{\circ}\text{C}$).

Pour plus d'informations sur le carpocapse rendez vous sur le site Ephythia en cliquant [ICI](#).



Chenille de Carpocapse
(Photo: B.Petit INRA)

Financé par



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

Frelon asiatique

Le frelon asiatique est présent partout en Bretagne. Les premières fondatrices ont été observées en février. Le piégeage des fondatrices s'est arrêté le 17 mai pour ne pas impacter le frelon Européen. Suite à une année 2025 « exceptionnelle » en terme de pression sur les ruchers et en terme de destructions des nids, le nombre de captures de gynes ou futures reines a été élevé ce printemps. Ce piégeage doit cibler uniquement les frelons asiatiques grâce à l'utilisation de pièges sélectifs (voir [site internet](#)). Les nids primaires sont construits dans les abris de jardins, hangars, sur les caches moineaux etc... Il est important de détruire ces nids primaires en s'assurant que la reine soit bien dans le nid (ce qui est le cas quand il fait nuit). Les nids primaires ont maintenant été délaissés et les nids secondaires sont dorénavant bien installés. Ceux-ci peuvent être bâtis dans les arbres, les haies, les bosquets, des bâtiments et même dans le sol. **Pour toutes observations de nids, contacter votre mairie qui vous donnera la marche à suivre.**

La prédation sur les ruchers est importante sur certains secteurs poussant des apiculteurs à déménager leurs ruchers. On remarque quand même une baisse du nombre de nids découvert à cet instant, par rapport à l'année dernière. Les températures extrêmes que nous avons subi cet été, ont probablement impacté la survie des frelons qui ne supportent pas une chaleur supérieure à 45°C.

Un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes a été élaboré par FREDON France et GDS France en 2024 pour tenter de lutter efficacement contre ce ravageur. Depuis [une loi a été adoptée le 14 mars 2025](#) et s'en est suivi la parution du [décret N° 2025-1377 le 29 décembre 2025](#), venant préciser les modalités d'adoption du plan national. [Un arrêté a été signé le 9 septembre 2026](#) portant adoption du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes.

Pour plus d'informations concernant ce plan et cet envahisseur, nous vous invitons à vous rendre sur [le site internet](#).

Nid secondaire de frelon asiatique démun
d'une partie de sa couche protectrice

(Photo: Chartres nuisibles)

LE NID SECONDAIRE

Observable durant l'été et l'automne



De la forme d'une goutte, base fermée avec une petite entrée latérale

On le trouve en hauteur (arbres, haies, garages, toitures...)

Peut contenir jusqu'à 3000 insectes en fin de saison

Taille volumineuse pouvant atteindre 1 m de diamètre



Financé par


MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Bulletin de Santé du Végétal Jardins,
Espaces Végétalisés et Infrastructures – Région Bretagne
BSV n°8 du 25 septembre 2026

La pyrale du buis: *Cydalima perspectalis*

On retrouve de rares chenilles de deuxième génération 2026 au stade L4 en jardins créant des défoliations faibles. Ces chenilles vont passer l'hiver sous forme de cocons et émergeront au printemps 2027.

Chenille de pyrale du buis
en semaine 39 à

Plougastel Daoulas (29)

(Photo: FREDON Bretagne)



Méthode de lutte:

En préventif:


- Mettre en place des pièges à phéromones à partir du mois d'avril (redémarrage du vol différé suivant les années) qui permettent de capturer les mâles, de limiter les fécondations de femelles mais aussi être avisé de leur présence pour une mise en alerte;
- Afin de limiter l'apparition des premières chenilles au mois de mars, il est possible d'enlever et de brûler les cocons d'hivernage présents sur les buis du mois de novembre au mois de février;
- Couvrir les pieds sains d'un voile d'hivernage ou équivalent pour éviter qu'ils ne soient contaminés à leur tour lors des différents vols de la pyrale;

En curatif:

- Utiliser un aspirateur pour retirer les chenilles des buis lors de leurs périodes d'activité;
- Couper les parties atteintes et les brûler;
- Si vous possédez des haies de buis ou des buis de grandes tailles, vous pouvez secouer ou frapper vos buis avec un bâton. Les chenilles étant sensibles aux vibrations, elles tomberont au sol. Pour faciliter le ramassage, disposer au préalable un filet ou un tissu aux pieds de vos buis. Vous pourrez ensuite ébouillanter, écraser ou brûler les chenilles;
- Lâcher des hyménoptères parasitoïdes oophages (Trichogrammes) dès l'apparition des premiers papillons;
- Utiliser du bacille de Thuringe en lutte biologique lorsque les chenilles se nourrissent;
- Des actions collectives de surveillance et de traitement sont indispensables pour limiter la propagation de la pyrale du buis;

Réseau de piégeage

Un réseau de piégeage des adultes de pyrale du buis a été mis en place. Voici les communes sélectionnées: Pleurtuit, Rennes (35), Plérin (22), Plougastel Daoulas, Plougoulm (29), Auray, Vannes, Josselin (56). Un premier pic de vol a été enregistré début juin et un second mi juillet. Les captures sont désormais nulles sur tous les sites mis à part à Plougoulm où, un papillon a été piégé en semaine 38.



Scirtothrips inermis

Cette espèce de thrips a été découverte cet été dans les espaces verts de la zone portuaire de Brest (29) sur rosier. Un seul individu a été prélevé. Il n'est pas rare de rencontrer cette espèce dans le bassin méditerranéen. Elle n'avait jamais été observée au Nord de l'Aquitaine. **Cette découverte est donc une première en Bretagne.**

C'est un insecte très petit, généralement difficile à observer à l'œil nu. Il engendre des déformations, décolorations de jeunes feuilles suite à de multiples piqûres d'alimentation. [Vous trouverez ICI](#) un document décrivant cette espèce de thrips.

Cicadelle verte

L'activité des cicadelles vertes est encore bien marquée ces dernières semaines engendrant des dégâts importants sur les végétaux. Ceux-ci déjà affaiblis par la sécheresse subissent de multiples piqûres d'alimentation sur feuillage réduisant drastiquement la photosynthèse. Les végétaux concernés sont: Pommier, romarin, noisetier, érable, églantier, ronce, rosier, néflier, fusain, prunellier, orme, charme, cornouiller, chêne, mélisse, châtaignier, tilleul, rosier, prunier, aulne, saule, cormier, sycomore.

Feuille de noisetier criblée de piqûres
de cicadelle

(Photo: FREDON Bretagne)



Larve de cicadelle verte

(Photo: FREDON Bretagne)

Financé par



Ambroisie à feuille d'armoise


L'Ambroisie à feuilles d'armoise est actuellement en cours de floraison. Ce stade de développement de la plante est le plus critique.

Le pollen de cette Astéracée représente un grand problème de santé publique ! Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les premiers symptômes apparaissent: pathologies respiratoires (rhinites, trachéites), conjonctivites et parfois urticaires. Ces derniers étant d'autant plus importants que le taux de pollen dans l'air est élevé. [En cliquant ICI](#) vous aurez accès à une carte interactive du site « Air Breizh » qui vous indiquera la qualité de l'air et l'indice pollen dans votre localité.



Ambroisie en fleurs

(Photo: FREDON Bretagne)



Si vous repérez de l'ambroisie, il est important de le [déclarer ICI](#) sur « Alertes espèces ». Si vous avez un doute quant à l'identification de la plante, contactez la FREDON Bretagne.

Financé par



AUXILIAIRES

Les auxiliaires sont encore bien actifs en ce moment. Ainsi on observe des larves et des adultes de syrpe, des larves et adultes de coccinelles, des pucerons parasités par des micro hyménoptères, des punaises anthocorides, des ichneumons et des larves de cécidomyie.



Larves de cécidomyie (couleur orange) dévorant des pucerons
(Photo: FREDON Bretagne)

[Vous trouverez ICI](#), un document traitant du sujet « favoriser les auxiliaires dans les espaces verts ».

Ce bulletin est publié à partir d'observations ponctuelles ou régulières, réalisées par un réseau d'épidémiosurveillance en jardins, espaces végétalisés et infrastructures (JEVI). S'il donne une tendance de la situation phytosanitaire régionale la plus représentative et objective possible, il reste nécessaire pour chaque gestionnaire de JEVI de considérer également le résultat de ses propres observations. Les informations contenues dans ce bulletin ne peuvent être transposées telles quelles à d'autres situations. Elles permettent de donner des tendances d'évolutions phytosanitaires à l'échelle de petites régions. FREDON Bretagne dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les gestionnaires d'espaces vert, jardiniers amateurs ou détenteurs de végétaux sur la base des informations communiquées dans ce bulletin.

Rédaction et animation : FREDON Bretagne

Directeur de la publication :

FREDON Bretagne

5, Rue A. de St Exupéry

35235 THORIGNE FOUILLARD

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du BSV JEVI numéro 3 du 13 mai 2026 »

Coordination et renseignements : Julien Kervella FREDON Bretagne, <mailto:julien.kervella@fredon-bretagne.com>

Financé par



Bulletin de Santé du Végétal Jardins,
Espaces Végétalisés et Infrastructures – Région Bretagne
BSV n°8 du 25 septembre 2026