

Sommaire

[Données météo P2](#)

[Colza](#)

[P2/P6](#)

Légende :



Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**



La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

	Indicateur de risque	L'essentiel
Colza : Majoritairement entre les stades « deux et trois feuilles vraies ».		
Les altises	Cotylédons - 3F	 Une hausse des dégâts est constatée avec parfois des dépassements du seuil. La météo reste favorable aux altises.
	Au-delà de 3F	
Les limaces		De rares dégâts ont été observés. Le sec est défavorable aux limaces.
Les pucerons du colza		Petite hausse des infestations.
Autres		La tenthrède est toujours observée. Du mildiou dans une parcelle et de la punaise des champs dans une autre.

Céréales : Maîtriser les repousses de céréales pour limiter le risque puceron, piétin échaudage et réduire la pression ray-grass.
Petit rappel: ne pas semer trop tôt, la période optimale est entre le 25 octobre et le 10 novembre.

A retrouver dans le [BSV n° 26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici](#):

Maïs : pour évaluer et réduire la future pression en pyrale et sésamie faire un sondage larvaire avant la récolte. Broyer les résidus après la récolte pour limiter les populations.

Plantes Exotiques Envahissantes : identifier et lutter contre le datura stramoine. Il est possible d'avoir des plants de datura levés pendant l'interculture après la récolte des céréales. Soyez vigilant. [Consultez la note régionale Datura en cliquant ici](#)

ACTUS REGLEMENTAIRE :

Le site R4P : Réseau de réflexions et de recherches sur les résistances aux pesticides.



Définition d'une résistance : la résistance aux Produits de Protection des Plantes (PPP, pesticides d'origine chimique ou naturelle) est la capacité héréditaire d'un bioagresseur à survivre à un traitement PPP appliqué correctement. Lorsqu'un individu est résistant à un PPP, il ne sera pas (ou peu) affecté par le traitement, et sera capable de produire une descendance viable. On parle alors de résistance biologique.

[Vous pouvez consulter ce site, qui vous présente des documents sur la résistance et sa gestion, en cliquant sur ce lien.](#)

ACTU SANITAIRE :

Les punaises des champs :

Elles pullulent et elles peuvent provoquer des dégâts sur des jeunes colzas. Aucune solution phytopharmaceutique n'est actuellement homologuée contre ce ravageur.

Dans ce contexte, une enquête est menée par Terres Inovia afin de mieux comprendre le ravageur. Pour y répondre : [enquête punaise - cliquez ici](#)



Données météo

[Retour sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C août (Normales)	Températures moyennes en °C 1-22 septembre (Normales)	Précipitations Cumul en mm août (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-22 septembre (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	22.1 (19.2)	19.2 (16.6)	54.6 (43.5)	7.2 (56.6)
	Miniac-Morvan	20.7 (19.2)	18.5 (16.6)	14.0 (43.5)	12.6 (56.6)
	Langon	22.7 (19.2)	19.4 (16.6)	30.6 (43.5)	7.0 (56.6)
Finistère	Brest	19.4 (16.9)	17.2 (15.4)	49.8 (75.3)	27.7 (78.6)
	Landivisiau	19.1 (16.9)	17.1 (15.4)	43.6 (75.3)	23.9 (78.6)
	Quimper	20.7 (16.9)	18.1 (15.4)	37.6 (75.3)	16.5 (78.6)
Morbihan	St-Avé	22.5 (18.3)	19.4 (16.1)	43.0 (53.3)	4.4 (65.7)
	Neulliac	20.9 (18.3)	18.1 (16.1)	51.0 (53.3)	10.1 (65.7)
	Taupont	21.9 (18.3)	19.5 (16.1)	30.4 (53.3)	4.4 (65.7)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	19.9 (17.4)	18.0 (15.5)	26.9 (44.5)	7.8 (52.4)
	Louargat	18.8 (17.4)	17.3 (15.5)	31.2 (44.5)	13.2 (52.4)
	St Glen	20.2 (17.4)	18.1 (15.5)	37.7 (44.5)	10.8 (52.4)



Données météo, du 1^{er} août au 22 septembre 2026 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Commentaire : Le déficit de précipitations et les températures supérieures aux normales de saison persistent au cours de cette troisième semaine de septembre.

Colza

Stades

41 parcelles ont été suivies entre le 17 septembre et le 22 septembre 2026 (semaine 39).



Graphique 1: stades des parcelles de colza du réseau.

Carte 1: stades du colza observés entre le 17/09 et le 22/09.

Les colzas sont majoritairement entre les stades 2 feuilles et 3 feuilles. Sur cette période de développement du colza, le risque altise, limace et tenthrède est toujours présent.




Altise d'hiver (grosse altise) et altise des crucifères (petite altise)


• Observations issues des parcelles du réseau

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Parcelles dans la période de risque (Cotylédons étalés - 3 feuilles vraies)			
		Nb parcelles dans la période de risque	Nb parcelles avec dégâts	Nb parcelles au seuil de risque	Dégâts moyens % pieds mordus - % surface foliaire détruite
17/09-22/09	40	28	25	1	48% - 7.7%
10/09-15/09	26	19	18	0	64% - 4.7%

Résultat des piégeages : 40 pièges ont été relevés cette semaine, 20 sont positifs. 216 grosses altises et 61 petites altises.



Carte 2 : parcelles observées pour les dégâts d'altises entre le 17/09 et le 22/09 (sem.39)



Graphique 2 : Dynamique de captures d'altises

• Analyse de risque et prévisions

Les dégâts sont en hausse et des dépassements de seuil commencent à être observés. Les conditions climatiques chaudes et sèches actuelles ralentissent les levées et la croissance des colzas. Cette situation devrait se maintenir jusqu'à la semaine prochaine.

Risque global colza stade Cotylédons - 3F: moyen à fort.

Risque globale colza stade au-delà de 3 F : faible.

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

De levée à 3 feuilles (B3) inclus. 80% des pieds avec des morsures et 25% de la surface foliaire détruite.



Vous retrouverez plus de détails sur la gestion du risque altise dans [BSV n°26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici.](#)



Attention au risque de résistances aux pyréthriinoïdes. Plus de détails sur le site de [Terres inovia—les résistances au pyréthriinoïdes.](#)

• Informations sur le ravageur

Vous retrouverez plus de détails sur l'identification des altises dans [BSV n°26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici.](#)

Source des photos : Terre Inovia



**Limace grise (*Deroceras reticulatum*) et limace noire (*Arion hortensis*)**• **Observations issues des parcelles du réseau**

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Parcelles dans la période de risque (Cotylédons étalés - 3 feuilles vraies)		
		Nb parcelles dans la période de risque	Nb parcelles avec dégâts	Dégâts moyens (min-max) % surface foliaire détruite
17/09-22/09	33	26	5	5% (2%-10%)
10/09-15/09	17	14	3	5% (5%-5%)

• **Analyse de risque et prévisions**

De rares dégâts. Les conditions climatiques sèches sont défavorables aux limaces.

Risque global :



faible.

• **Gestion du risque**

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis au stade 3 feuilles (B3). Il n'existe pas de seuil indicatif de risque.

Il est donc important de surveiller vos parcelles pour anticiper les dégâts avec l'observation des plantes et le piégeage.



Vous retrouverez plus de détails sur la gestion du risque limace dans [BSV n° 26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici](#).

La grille d'évaluation du risque parcellaire est à télécharger [en cliquant sur le lien suivant, grille limace](#).




Des produits de biocontrôles existent : par exemple ceux à base de phosphate ferrique.

• **Informations sur le ravageur****La limace grise**

Couleur rose violacé pour les jeunes et de couleur gris beige pour les adultes.

Taille au repos est de 4 à 5 cm.

**La limace noire**

Couleur gris bleuâtre pour les jeunes et de couleur noire pour les adultes.

Taille au repos est de 2.5 à 4 cm.

Article Terres-inovia sur [la gestion limace en cours de campagne - cliquez ici](#) et sur [l'estimation du risque - cliquez ici](#)



Pucerons du colza (*Puceron vert du pêcher, puceron du navet et le puceron cendré du chou*)

• Observations issues des parcelles du réseau

Sur les vingt-cinq parcelles du réseau qui ont été suivies pour ce ravageur, sept présentent des pucerons verts sur les colzas. En moyenne, l'infestation est de 7%, deux parcelles ont 20% de colzas infestés. Une est située à Grâces dans les Côtes-d'Armor, cependant la variété CRAFTER est tolérante au virus, il n'y a pas de risque. L'autre parcelle est située à Pontivy dans le Morbihan, la variété BESSITO n'a pas été évaluée sur le risque de résistance. Un risque est possible si les pucerons sont vecteurs du virus.

• Analyse de risque et prévisions

Hausse des infestations. Les conditions climatiques restent favorables.

Risque global colza stade Cotylédons - 6F:  faible.

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis au stade 6 feuilles (B6). Le seuil de risque est de 20% de plantes infestées pour les variétés non résistantes au virus du TUYV et qui n'ont pas dépassé le stade 6 feuilles. Pour rappel, le puceron vert du pêcher est le plus préjudiciable puisqu'il peut transmettre 3 virus.



La gestion du risque est principalement variétale mais aussi par la présence d'auxiliaire

- Afin de vérifier si votre variété présente une résistance au virus, consultez sa fiche sur [le site de myVar cliquez-ici](#).
- Les auxiliaires jouent un rôle non négligeable sur la gestion des pucerons ([découvrez les fiches auxiliaires en cliquant-ici](#)).



Attention au risque de résistances du puceron vert face aux pyréthriinoïdes et au pyrimicarbe. Plus de détails sur le site de Terres inovia—les pucerons

• Informations sur le ravageur



Puceron vert du pêcher (aptère et ailé)



Puceron cendré du chou



Puceron du navet

Le puceron vert, le puceron cendré du chou et le puceron du navet peuvent coloniser le colza à l'automne. Les dégâts directs dus à la présence de ces insectes dans les cultures restent exceptionnels. Ces trois pucerons peuvent cependant transmettre des viroses, essentiellement, deux mosaïques (CaMV et TuMV) et une jaunisse (TuYV).

Le puceron vert du pêcher est le plus redouté. Plus de détails sur le site de Terres Inovia : [les pucerons—cliquez ici](#)



Autres signalements :

La tenthrède de la rave :

Ce ravageur a été observé dans dix-sept parcelles réparties dans la région. Il s'agit principalement d'adultes qui ont été capturés. Des dégâts liés aux larves ont été observés dans six parcelles situées en Ile-et-Vilaine et dans le Morbihan. Ces dégâts restent limités, avec 4 % de la surface foliaire touchée et 5 % des plants avec la présence de la larve.

Pour rappel : la période de sensibilité est du stade de la levée à 6 feuilles (B6). Le risque est atteint si plus d'1/4 de la surface foliaire est détruite par la larve.



Larve de tenthrède de la rave



Adulte de tenthrède de la rave

Le mildiou : il a été observé dans une parcelle située dans les Côtes-d'Armor. 50% des plants sont touchés.



Symptômes de mildiou sur colza à l'automne. Source : Terres Inovia

La punaise des champs : une parcelle dans les Côtes-d'Armor a entièrement été ravagée par la punaise des champs.

Céréales à paille

[Retour](#)
[sommaire](#)



Maîtriser les repousses de céréales pour limiter le risque puceron, piétin échaudage et réduire la pression ray-grass.

Lutte préventive contre les pucerons d'automne :

Les pucerons présents à l'automne (principalement *Rhopalosiphum padi*) peuvent transmettre le virus de la jaunisse nanisante de l'orge (JNO) aux jeunes plants de céréales, entre la levée et le stade 3 feuilles. La destruction des repousses de céréales permet de réduire les populations de pucerons avant les nouveaux semis.

Le piétin échaudage, une maladie qui a besoin d'hôte rapidement.

Le champignon du sol responsable du piétin échaudage, *Gaeumannomyces graminis tritici*, a besoin de plantes hôtes pour survivre. Les repousses de céréales, le long des andains, sont des hôtes idéales pour maintenir vivant le champignon. Plus d'informations sur la maladie [sur le site d'Arvalis—fiche piétin échaudage](#).

Réduire le salissement, notamment en ray-grass, par les faux semis à l'automne :

Les plantes adventices exercent une concurrence avec les céréales notamment l'eau, la lumière... et crée un milieu favorable à l'installation et au développement de certaines maladies (piétin échaudage) ou ravageurs (pucerons à l'automne). Une des mesures de prophylaxie possible à mettre en place est le **faux semis** qui permet de stimuler les levées des plantes adventices avant l'implantation de la culture et avoir une action directe sur la réduction du stock semencier.

Le faux semis doit être réalisé sur un sol frais avec un travail du sol superficiel (2 à 4 cm maximum) pour maximiser la levée des adventices. Attention à réaliser le dernier faux-semis 3 semaines avant l'implantation de la culture suivante. Par la suite, les adventices levées doivent être détruites avant l'implantation de la culture, de préférence en conditions sèches.

PROCHAIN BSV: MARDI 29 SEPTEMBRE 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
AGRIAL, COOP LE GOUessant, CRA BRETAGNE, EAS, EUREDEN, FREDON BRETAGNE, LYCEE DE BREHOULOU.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Françoise MAHEO. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 63

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :

La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>

La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>

La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

Pour recevoir gratuitement les BSV : inscrivez-vous sur le site de FREDON Bretagne : [Formulaire d'inscription](#)
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [Formulaire pour envoi de mail](#).