

Sommaire

[Données météo P2](#)

[Colza](#)

[P2/P6](#)

Légende :



Risque global très faible



Risque global très fort



Prophylaxie



Biocontrôle



Résistance

Avec le soutien financier de



Financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**



**La stratégie
écophyto 2030**

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Indicateur
de risque

L'essentiel

Colza : Majoritairement entre les stades 7 feuilles et 10 feuilles. **Fin des observations sur colza**

[Les altises](#)

Cotylédons - 3F



3-4 F



[Les limaces](#)

Cotylédons - 3F



Les parcelles du réseau BSV sont sorties de la période de risque ravageurs.

Toutefois, dans plusieurs secteurs hors BSV, des levées tardives sont constatées, notamment dans les situations ayant reçu peu ou pas de pluie. Pour ces parcelles, le risque lié aux ravageurs reste présent tant que les colzas n'ont pas atteint le stade 3 à 4 feuilles, voire 6 feuilles pour les tenthrèdes de la rave.

Colza - larves de grosses altises : il est possible d'observer les larves d'altises issues des vols de septembre. Pour évaluer le risque parcellaire, vous pouvez utiliser l'OAD de Terres Inovia.

Pour le consulter cliquez sur ce lien : [OAD risque larve grosse altise](#). Rappel des méthodologies d'observation.

Hernie des crucifères : Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, remplir l'enquête de Terres-Inovia. [Enquête Hernie-cliquez ici](#)

Céréales : Maitriser les repousses de céréales pour limiter le risque puceron, piétin échaudage et réduire la pression ray-grass.

Pour la lutte contre les graminées, une fiche technique, Co-rédigé par Arvalis et un plusieurs partenaires, est à consulter en [cliquant ici](#)

Petit rappel : ne pas semer trop tôt, la période optimale est entre le 20-25 octobre et le 5-10 novembre.

LES ACTUALITES DU MOMENT

ACTUS TECHNIQUES : l'utilisation des régulateurs de croissance sur colza à l'automne est une action souvent inutile et coûteuse en dehors des situations qui cumulent les facteurs à risque.

Pour vous aider dans la prise de décision, vous pouvez utiliser l'OAD de Terres Inovia.

Pour cela, rendez-vous le site internet [en cliquant sur le lien suivant](#). Outil : [régulateur automne colza](#)



ACTU BIODIVERSITE :



Données météo

[Retour sommaire](#)


Stations météo		Températures moyennes en °C septembre (Normales)	Températures moyennes en °C 1-20 octobre (Normales)	Précipitations Cumul en mm septembre (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-20 octobre (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	19.1 (16.6)	15.1 (13.2)	30.4 (56.6)	26.8 (73.1)
	St-Malo	18.2 (16.6)	15.7 (13.2)	38.4 (56.6)	36.4 (73.1)
	Langon	19.4 (16.6)	15.3 (13.2)	41.0 (56.6)	31.0 (73.1)
Finistère	Brest	17.1 (15.4)	14.3 (12.8)	52.2 (78.6)	79.2 (129.4)
	Landivisiau	16.9 (15.4)	14.1 (12.8)	41.7 (78.6)	69.1 (129.4)
	Quimper	17.9 (15.4)	14.9 (12.8)	30.8 (78.6)	76.5 (129.4)
Morbihan	Plumergat	19.3 (16.1)	14.4 (13.2)	15.6 (65.7)	69 (103.8)
	Neulliac	17.9 (16.1)	14.2 (13.2)	17.6 (65.7)	30.2 (103.8)
	Ploërmel	19.3 (16.1)	14.4 (13.2)	23.4 (65.7)	45.2 (103.8)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	17.8 (15.5)	14.7 (12.6)	10.2 (52.4)	35.7 (81.6)
	Louargat	17.1 (15.5)	13.6 (12.6)	15.8 (52.4)	43.4 (81.6)
	St Glen	17.9 (15.5)	14.1 (12.6)	16.8 (52.4)	24.6 (81.6)


Données météo, du 1^{er} septembre au 20 octobre 2026 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.

Commentaire : Le mois d'octobre reste marqué par des températures supérieures aux normales de saison et un déficit global de précipitations. Toutefois, la tendance pourrait s'inverser au cours des dix prochains jours, avec un retour de conditions plus fraîches et plus humides. À noter que les pluies déjà enregistrées et celles attendues ne seront pas suffisantes pour compenser le déficit hydrique en profondeur des sols.


Colza

Stades

21 parcelles ont été suivies entre le 15 octobre et 20 octobre 2026 (semaine 43).



Carte 1: stades du colza observés entre le 15/10 et le 20/10.



Graphique 1 : stades des parcelles de colza du réseau.

Les colzas du réseau BSV sont majoritairement compris entre les stades 7 feuilles et 10 feuilles. À ce stade de développement, la culture n'est plus en période de risque vis-à-vis des altises, des limaces et des tenthrèdes de la rave, le colza étant en mesure de compenser les dégâts éventuels.

En dehors du réseau BSV, plusieurs secteurs ayant reçu peu ou pas de pluie sont confrontés à des levées tardives. Dans ces situations, les colzas n'ont pas encore atteint un stade de développement suffisant et restent exposés au risque lié aux ravageurs.




Altise d'hiver (grosse altise) et altise des crucifères (petite altise)

• Observations issues des parcelles du réseau

Toutes les parcelles du réseau BSV suivies cette semaine sont hors de la période de risque (> 3-4 feuilles).

Résultat des piégeages : 21 pièges ont été relevés cette semaine. 17 sont positifs : 228 grosses altises et 11 petites altises.



Graphique 2 : Dynamique de captures d'altises

• Analyse de risque et prévisions

Bien que les parcelles du réseau BSV soient en dehors des stades à risque, ce n'est pas le cas de l'ensemble des parcelles de la région. Plusieurs secteurs ayant reçu peu de pluie présentent des colzas à levée tardive, qui restent exposés au risque. Les altises demeurent actives malgré la baisse des températures. Tant que les plantes n'ont pas dépassé le stade 3 à 4 feuilles, le risque reste important.

Risque global colza stade cotylédons - 3F : fort.

Risque global colza stade 3-4 F : moyen à fort

Risque global colza stade 5 F et + : faible

• Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

De levée à 3 feuilles (B3) inclus. 80% des pieds avec des morsures et 25% de la surface foliaire détruite.



Vous retrouverez plus de détails sur la gestion du risque altise dans [BSV n°26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici.](#)



Attention au risque de résistances aux pyréthriinoïdes. Plus de détails sur le site de [Terres inovia—les résistances au pyréthriinoïdes.](#)

• Informations sur le ravageur

Vous retrouverez plus de détails sur l'identification des altises dans [BSV n°26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici.](#)

Source des photos : Terre Inovia





Limace grise (*Deroceras reticulatum*) et limace noire (*Arion hortensis*)

- Observations issues des parcelles du réseau

Toutes les parcelles du réseau BSV suivies cette semaine sont hors de la période de risque (> 3-4 feuilles).

- Analyse de risque et prévisions

Bien que les parcelles du réseau BSV soient en dehors des stades à risque, ce n'est pas le cas de l'ensemble des parcelles de la région. Plusieurs secteurs ayant reçu peu de pluie présentent des colzas à levée tardive, qui restent exposés au risque. Avec le retour des pluies, les conditions deviennent favorables à l'activité des limaces. Tant que les plantes n'ont pas dépassé le stade 3 à 4 feuilles, le risque reste présent.

Risque global colza stade Cotylédons - 3F:  faible à moyen.

Risque globale colza stade au-delà de 3 F :  faible.

- Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis au stade 3 feuilles (B3). Il n'existe pas de seuil indicatif de risque.

Il est donc important de surveiller vos parcelles pour anticiper les dégâts avec l'observation des plantes et le piégeage.



Vous retrouverez plus de détails sur la gestion du risque limace dans [BSV n° 26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici.](#)

La grille d'évaluation du risque parcellaire est à télécharger [en cliquant sur le lien suivant, grille limace.](#)



Des produits de biocontrôles existent : par exemple ceux à base de phosphate ferrique.


- Informations sur le ravageur



La limace grise

Couleur rose violacé pour les jeunes et de couleur gris beige pour les adultes.

Taille au repos est de 4 à 5 cm.



La limace noire

Couleur gris bleuâtre pour les jeunes et de couleur noire pour les adultes.

Taille au repos est de 2.5 à 4 cm.

Article Terres-inovia sur [la gestion limace en cours de campagne - cliquez ici](#) et sur [l'estimation du risque - cliquez ici](#)

**Pucerons du colza** (*Puceron vert du pêcher, puceron du navet et le puceron cendré du chou*)• **Observations issues des parcelles du réseau**

Période de suivi	Nb parcelles suivies	Parcelles dans la période de risque (Cotylédons étalés - 6 feuilles vraies)		
		Nb parcelles dans la période de risque	Nb parcelles infestées - puceron vert	Infestation moyenne (min-max) % de plants infestés
15/10-20/10	10	3	0	0%
08/10-13/10	25	14	0	0%

Quelques parcelles, en dehors de la période de risque, ont des pucerons sur les colzas.

• **Analyse de risque et prévisions**

La quasi-totalité des parcelles du réseau BSV est sortie de la période de risque. La présence de nombreuses momies de pucerons (couleur dorée et aspect gonflé), témoignant de l'activité des auxiliaires (microguêpes parasitoïdes), contribue à réduire fortement le risque. Les conditions climatiques restent néanmoins favorables au développement des populations de pucerons.

Risque global colza stade Cotylédons - 6 F:  **faible.**

• **Gestion du risque**

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis au stade 6 feuilles (B6). Le seuil de risque est de 20% de plantes infestées pour les variétés non résistantes au virus du TUYV et qui n'ont pas dépassé le stade 6 feuilles. Pour rappel, le puceron vert du pêcher est le plus préjudiciable puisqu'il peut transmettre 3 virus.

**La gestion du risque est principalement variétale mais aussi par la présence d'auxiliaire**

- Afin de vérifier si votre variété présente une résistance au virus, consultez sa fiche sur [le site de myVar cliquez-ici](#).
- Les auxiliaires jouent un rôle non négligeable sur la gestion des pucerons ([découvrez les fiches auxiliaires en cliquant-ici](#)).




Attention au risque de résistances du puceron vert face aux pyréthrinoides et au pyrimicarbe. Plus de détails sur le site de Terres inovia—les pucerons

• **Informations sur le ravageur**

Vous retrouverez plus de détails sur l'identification des pucerons dans [BSV n°26 du 15 septembre 2026 - cliquez ici](#).

Source des photos : Terre Inovia

Source des photos et texte : Terre Inovia



Puceron momifié par l'activité de microguêpe.



Puceron vert du pêcher (aptere et ailé)





Autres signalements :

La tenthrède de la rave :

Des dégâts liés à ce ravageur ont été observés dans 2 parcelles situées dans le Morbihan et le Finistère. Les dégâts sont en moyenne de 5 % de surface foliaire détruite (maximum : 10 %). La présence de larves a été observée dans une parcelle, avec une infestation moyenne de 100 %.

Pour rappel : la période de sensibilité est du stade de la levée à 6 feuilles (B6). Le risque est atteint si plus d'1/4 de la surface foliaire est détruite par la larve.



Larves (fausse chenille) de la tenthrède la rave dévorant du colza.
Source : Fredon Bretagne



Adulte de la tenthrède la rave sur colza.
Source : Fredon Bretagne

Noctuelles défoliatrices :

Quelques observations de noctuelles défoliatrices, notamment dans le 35.



Larve de noctuelle défoliatrice
Source: Fredon Bretagne

Charançon du bourgeon terminal :

Aucun nouveau signalement cette semaine.

Dans les secteurs où sa présence est historiquement connue, des vols sont possibles.

Pour connaître le risque, il est conseillé d'utiliser l'OAD "prédiction des vols de ravageur". Pour cela cliquez sur l'icône ci-dessous.



Charançon du bourgeon terminal.
Source : INRAe

Si vous voulez identifier correctement le charançon du bougeron terminal, cliquez-ici : [identification du charançon du bourgeon terminal](#)



Larves d'altises d'hiver : priorité à l'observation de vos propres parcelles

• Prévisions des périodes d'éclosion et stade larvaire

L'observation est plus aisée lorsque les larves ont atteint le stade L2.

C'est également à ce stade qu'elles sont le plus fragiles.

D'après le modèle, les larves issues des vols d'altises adultes du 20-25 septembre sont observables au stade L2 ou le seront dans les prochains jours.

 Période favorable à l'observation des larves

	Date théorique début de vol	Date théorique d'apparition du stade larvaire		
		Mue L1	Mue L2	Mue L3
22-Plouguenast	20-sept	10-oct	16-oct	29-oct
	25-sept	18-oct	30-oct	15-nov
	01-oct	01-nov	28-nov	01-févr
	05-oct	14-nov	22-déc	09-mars
	10-oct	15-déc	03-mars	28-mars
29-Saint Segal	20-sept	09-oct	15-oct	24-oct
	25-sept	16-oct	26-oct	04-nov
	01-oct	27-oct	07-nov	21-nov
	05-oct	03-nov	15-nov	16-déc
	10-oct	11-nov	08-déc	01-janv
35-Rennes	20-sept	06-oct	13-oct	20-oct
	25-sept	13-oct	22-oct	31-oct
	01-oct	26-oct	05-nov	24-nov
	05-oct	02-nov	15-nov	21-déc
	10-oct	14-nov	20-déc	15-févr
56-Bignan	20-sept	08-oct	15-oct	25-oct
	25-sept	16-oct	27-oct	09-nov
	01-oct	30-oct	11-nov	20-déc
	05-oct	08-nov	27-nov	15-janv
	10-oct	24-nov	08-janv	22-févr

• Gestion du risque



Attention au risque de résistance aux pyréthrinoïdes. Plus de détails sur le site de [Terres inovia—les résistances aux pyréthrinoïdes.](#)

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du stade rosette jusqu'à décollement du bourgeon terminal.

Pour évaluer le risque vous pouvez utiliser l'OAD de Terres Inovia en cliquant sur l'icône.

Il dépend du risque à la parcelle. Mais pour résumer :

- ✓ En l'absence de risque agronomique, seuil indicatif de 5 larves par pied.
- ✓ En cas de risque agronomique identifié, seuil indicatif de 2-3 larves par pied.



• Méthodes d'observations

- ✓ **Méthode de dissection** : prélever aléatoirement 20 plantes dans la parcelle, les couper longitudinalement au niveau des pétioles et bien observer pour noter la présence ou non de larves.
- ✓ **Méthode Berlèse** : prélever 20 plantes en les coupant au niveau du collet, éliminer l'extrémité des feuilles et les laver. Ensuite, disposer les plantes sur un grillage au-dessus d'un récipient avec un mélange (eau + alcool). Ce dispositif doit être installé dans une pièce chauffée et aérée pour favoriser le dessèchement des plantes. Les larves tomberont dans la solution au bout d'une semaine environ.

Attention risque de confusion possible avec d'autres larves. Plus de détails sur l'article de Terres-Inovia [cliquez-ici.](#)

Larve de charançon



Larve d'altise d'hiver



Larve de mineuses (asticots)






Hernie des crucifères

La **hernie des crucifères**, maladie racinaire, provoque des renflements ou galles du système racinaire du colza et de nombreuses **crucifères** dès l'automne. **L'arrachage de pieds permet d'observer ces symptômes racinaires.**

Ces hypertrophies sont de forme et de grosseur variables. Les galles sont d'abord fermes (intérieur plein) et blanches, puis brunissent et se craquellent, puis pourrissent. La dégradation du système racinaire entraîne la mort de la plante dans la majorité des cas. Les symptômes observés sur les parties aériennes vont du flétrissement temporaire du feuillage, au cours de chaudes journées, à un défaut de croissance et à un rougissement des plantes infectées. Avant l'apparition des symptômes sur feuilles, la maladie peut déjà avoir progressé considérablement dans les racines.

(Source texte et photo : Terres-Inovia).



- **Les facteurs favorables sont :**

- Des sols limoneux à pH acide, hydromorphe et battant ;
- Des températures comprises entre 20-25°C et une humidité relative du sol supérieure à 80%. Les fortes orages et l'irrigation sont des facteurs aggravants en cas de présence de hernie ;
- Le retour fréquent du colza dans la rotation mais aussi l'implantation de crucifères comme CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate) ;
- Un mauvais désherbage, notamment des crucifères, et le maintien des repousses de colza après la récolte ;
- D'autres facteurs favorisent également le développement de la maladie : semis précoce, mauvais drainage de la parcelle ou l'absence de chaulage pour les sols acides ;

Attention à la dissémination de la hernie ! Les outils de travail du sol souillés dans une parcelle infestée sont des vecteurs potentiels de la hernie, tout comme des végétaux contaminés, de l'eau d'irrigation ou des fumiers contaminés. (Source texte : Terres-Inovia).

Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site de Terres-Inovia. [Fiche hernie des crucifères.](#)

Dans le BSV de cette semaine, aucun cas n'a été recensé. Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, n'hésitez pas à remonter l'information en remplissant l'enquête menée par Terres-Inovia ci-contre. [Enquête Hernie](#)

Céréales à paille

[Retour](#)
[sommaire](#)



Maîtriser les repousses de céréales pour limiter le risque puceron, piétin échaudage et réduire la pression ray-grass.

Lutte préventive contre les pucerons d'automne :

Les pucerons présents à l'automne (principalement *Rhopalosiphum padi*) peuvent transmettre le virus de la jaunisse nanisante de l'orge (JNO) aux jeunes plants de céréales, entre la levée et le stade 3 feuilles. La destruction des repousses de céréales permet de réduire les populations de pucerons avant les nouveaux semis.

Le piétin échaudage, une maladie qui a besoin d'hôte rapidement.

Le champignon du sol responsable du piétin échaudage, *Gaeumannomyces graminis tritici*, a besoin de plantes hôtes pour survivre. Les repousses de céréales, le long des andains, sont des hôtes idéales pour maintenir vivant le champignon. Plus d'informations sur la maladie [sur le site d'Arvalis—fiche piétin échaudage](#).

Réduire le salissement, notamment en ray-grass, par les faux semis à l'automne :

Les plantes adventices exercent une concurrence avec les céréales notamment l'eau, la lumière... et crée un milieu favorable à l'installation et au développement de certaines maladies (piétin échaudage) ou ravageurs (pucerons à l'automne). Une des mesures de prophylaxie possible à mettre en place est le **faux semis** qui permet de stimuler les levées des plantes adventices avant l'implantation de la culture et avoir une action directe sur la réduction du stock semencier.

Le faux semis doit être réalisé sur un sol frais avec un travail du sol superficiel (2 à 4 cm maximum) pour maximiser la levée des adventices. Attention à réaliser le dernier faux-semis 3 semaines avant l'implantation de la culture suivante. Par la suite, les adventices levées doivent être détruites avant l'implantation de la culture, de préférence en conditions sèches.

PROCHAIN BSV: MARDI 27 OCTOBRE 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
AGRIAL, COOP LE GOUSSANT, CRA BRETAGNE, EUREDEN, FREDON BRETAGNE, LYCEE DE BREHOULOU.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Françoise MAHEO. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 63

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :

La FREDON Bretagne : <https://fredon-bretagne.com/>

La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : <https://bretagne.chambres-agriculture.fr/>

La DRAAF Bretagne : <https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/>

Pour recevoir gratuitement les BSV : inscrivez-vous sur le site de FREDON Bretagne : [Formulaire d'inscription](#)
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : [Formulaire pour envoi de mail](#).