Sommaire

Données météo P2
Céréales P2/P4
Colza P4/P5

Légende :

Risque global très faible

Risque global très fort

Prophylaxie

Biocontrôle

Résistance

	Indicateur de risque	L'essentiel
Céréales : Les semis d'octobre sont majoritairement aux stades 2 à 3 feuilles, tandis que ceux réalisés en novembre sont entre les stades levée et 1 feuille.		
Puceron	Stades 1-2 F. / Stade levée	Petite hausse des infestations, notamment en Ille-et-Vilaine. Le retour du froid sera défavorable à l'installation de nouvelles colonies.
Limaces		Les dégâts restent rares et les conditions climatiques ne sont pas favorables à l'activité des limaces.
Colza - larves de grosses altises : il est possible d'observer les larves d'altises issues des vols de début octobre. Pour évaluer le risque parcellaire, vous pouvez utiliser l'OAD de Terres Inovia. Pour le consulter cliquez sur ce lien : OAD risque larve grosse altise. **Rappel des méthodologies d'observation.**		
Hernie des crucifères : Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, remplir l'enquête de Terres-Inovia. Enquête Hernie—cliquez ici		

Avec le soutien financier de

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**

GOUVERNEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

LES ACTUALITES DU MOMENT

ACTU TECHNIQUE : Bien observer les pucerons sur céréales.

L'observation doit se faire idéalement en l'absence de pluie et aux heures les plus chaudes.

Il faut observer 10 pieds de céréales consécutifs dans 5 zones différentes de la parcelle (soit 50 plantes). Les pucerons se trouvent à l'aisselle des feuilles ou à la base du collet.

Vous trouverez plus de détails sur la méthodologie d'observation, les conditions favorables et l'identification des pucerons dans ce BSV. Pour cela cliquez-ici



Puceron des céréales (forme aptère et ailée) *Rhopalosiphum padi*
Source: FREDON

ACTU REGLEMENTAIRE :

Le site R4P : Réseau de réflexions et de recherches sur les résistances aux pesticides.

Vous pouvez consulter ce site, qui vous présente des documents sur la résistance et sa gestion, en cliquant sur ce lien.

ACTU BIODIVERSITE :







MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGRO-ALIMENTAIRE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
FREDON BRETAGNE
CHAMBRE D'AGRICULTURE BRETAGNE
Terres Inovia
ARVALIS

Données météo

Retour sommaire


Stations météo		Températures moyennes en°C octobre (Normales)	Températures moyennes en°C 1-24 novembre (Normales)	Précipitations Cumul en mm octobre (Normales)	Précipitations Cumul en mm 1-24 novembre (Normales)
Ille-et-Vilaine	Rennes	14.0 (13.2)	9.8 (9.2)	51.5 (73.1)	81.9 (73.2)
	Miniac-Morvan	13.7 (13.2)	9.3 (9.2)	71.8 (73.1)	84.6 (73.2)
	Langon	14.1 (13.2)	10.2 (9.2)	58.0 (73.1)	87.0 (73.2)
Finistère	Brest	13.3 (12.8)	10.5 (9.7)	152.7 (129.4)	108.2 (146.7)
	Landivisiau	13.2 (12.8)	102.2 (9.7)	135.6 (129.4)	105.8 (146.7)
	Quimper	13.9 (12.8)	10.7 (9.7)	145.1 (129.4)	115.1 (146.7)
Morbihan	St-Avé	14.2 (13.2)	10.5 (9.8)	70.4 (103.8)	92.4 (107.6)
	Neulliac	13.1 (13.2)	9.1 (9.8)	77.4 (103.8)	101.8 (107.6)
	Taupont	13.9 (13.2)	10.1 (9.8)	50.2 (103.8)	81.4 (107.6)
Côtes-d'Armor	St Brieuc	13.6 (12.6)	9.8 (9.2)	68.7 (81.6)	48.3 (87.7)
	Louargat	11.6 (12.6)	9.2 (9.2)	115.2 (81.6)	87.0 (87.7)
	Mérillac	12.9 (12.6)	8.9 (9.2)	63.0 (81.6)	94.2 (87.7)

Données météo, du 1er octobre au 24 novembre 2026 : source MétéoData. Normales de saison : Source MétéoFrance.


Commentaire : Du 1er au 24 novembre, les températures sont globalement légèrement supérieures aux normales de saison en Bretagne. Les précipitations sont contrastées selon les secteurs. L'Ille-et-Vilaine a des cumuls qui dépasse la normale mensuelle, tandis que le Morbihan et certaines zones des Côtes-d'Armor ont plutôt un déficit pluviométrique marqué. Dans le Finistère, les pluies sont restées abondantes mais généralement inférieures aux normales saisonnières. Pour la dernière semaine de novembre, un retour du froid est attendu et avec de possibles épisodes de pluvieux.

Blé et orge

Stades



Carte 1 : stades du blé et de l'orge entre le 19/11 et le 24/11 (semaine 48).




Graphique 1 : stades des parcelles de blé et d'orge du réseau.

Quarante-trois parcelles (28 de blé et 15 d'orge) ont été suivies entre le 19 et le 24 novembre 2026.
Les parcelles sont principalement au stade 1 feuille étalée. Les semis effectués avant le 30 octobre sont entre 2 et 3 feuilles étalées.


Retour sommaire

Les pucerons d'automne

- Observations issues des parcelles du réseau



Graphique 2 : évolution de la pression puceron par semaine



Carte 2 : parcelles observées en fonction du seuil de risque puceron – observations faites entre 19/11 et le 24/11 (semaine 48).

- Analyse de risque et prévisions

Le nombre de parcelles infestées est en légère hausse, notamment en Ille-et-Vilaine. Cependant, le retour d'un épisode de froid devrait ralentir la propagation des pucerons. Les températures ne seront pas suffisantes pour tuer les colonies déjà installées.

Pour rappel, le risque puceron ne concerne que les variétés non tolérantes à la JNO.

Pour les parcelles, au stade 1-2 feuilles :  **faible à moyen**

Pour les parcelles tout juste levées :  **faible**

- Gestion du risque

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

De la levée jusqu'au stade « début tallage ».
Le seuil de risque ne concerne que les variétés non tolérantes à la JNO.
Seuil : 10% des pieds colonisés par au moins un puceron ou présence de pucerons pendant + de 10 jours dans la parcelle.

Attention, le recours systématique à une voire plusieurs applications, sans nécessité et en conditions non optimales, peut engendrer plus rapidement l'apparition de résistances.

La liste des variétés tolérantes et la méthodologie pour l'observation des pucerons, est **à retrouver dans** le BSV n°34 du 17 novembre 2026. Pour le consulter—cliquez ici.

Retour sommaire

Limace grise *(Deroceras reticulatum)* et limace noire *(Arion hortensis)*

- **Observations issues des parcelles du réseau**

Observation sur plantes :

Période de suivie	Nb parcelles suivies	Nb parcelles dans la période de risque (levée-tallage)	Nb parcelles avec dégâts	Nb parcelles au seuil de risque	Dégâts moyen (min-max) (% de surface foliaire détruite).
19/11-24/11	39	36	3	0	3.6% (1%-5%)
12/11-17/11	24	22	1	0	5%

- **Analyse de risque et prévisions**

Les dégâts restent rares et faibles. Le retour du froid sera défavorable à l'activité des limaces.

Risque global :  **faible**

- **Gestion du risque**

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du semis jusqu'au stade « 3-4 feuilles ». Plus de 30% des plantes présentant des dégâts.

Les informations sur les différents leviers ainsi que la grille de risque sont à retrouver dans le BSV n°34 du 17 novembre 2026. Pour le consulter—cliquez ici.

Colza

Larves d'altises d'hiver : priorité à l'observation de vos propres parcelles

- **Prévisions des périodes d'éclosion et stade larvaire**

L'observation est plus aisée lorsque les larves ont atteint le stade L2. C'est également à ce stade qu'elles sont le plus fragiles. D'après le modèle, les larves issues des vols d'altises adultes du premier octobre sont observables au stade L2. La méthodologie pour l'observation des larves, est à retrouver **dans le BSV n°34 du 17 novembre 2026. Pour le consulter—cliquez ici.**

Période favorable à l'observation des larves

	Date théorique début de vol	Date théorique d'apparition du stade larvaire		
		Mue L1	Mue L2	Mue L3
22-Plouguenast	20-sept	10-oct	16-oct	28-oct
	25-sept	18-oct	31-oct	23-nov
	01-oct	03-nov	30-nov	16-févr
	05-oct	19-nov	04-janv	16-mars
	10-oct	21-déc	09-mars	29-mars
29-Saint Segal	20-sept	09-oct	15-oct	24-oct
	25-sept	16-oct	26-oct	10-nov
	01-oct	27-oct	13-nov	01-déc
	05-oct	09-nov	26-nov	22-déc
	10-oct	21-nov	18-déc	14-janv
35-Rennes	20-sept	06-oct	13-oct	20-oct
	25-sept	13-oct	22-oct	01-nov
	01-oct	25-oct	11-nov	02-déc
	05-oct	07-nov	24-nov	24-déc
	10-oct	22-nov	23-déc	22-févr
56-Bignan	20-sept	08-oct	15-oct	25-oct
	25-sept	16-oct	27-oct	15-nov
	01-oct	01-nov	20-nov	20-déc
	05-oct	14-nov	05-déc	23-janv
	10-oct	02-déc	06-janv	02-mars

- **Gestion du risque**

R Attention au risque de résistance aux pyréthrinoïdes. Plus de détails sur le site de Terres inovia—les résistances aux pyréthrinoïdes.

Période de suivi et seuil indicatif de risque :

Du stade rosette jusqu'à décollement du bourgeon terminal.

Pour évaluer le risque vous pouvez utiliser l'OAD de Terres Inovia en cliquant sur l'icône.

Retour sommaire

Hernie des crucifères



La **hernie des crucifères**, maladie racinaire, provoque des renflements ou galles du système racinaire du colza et de nombreuses **crucifères** dès l'automne. **L'arrachage de pieds permet d'observer ces symptômes racinaires.**
Ces hypertrophies sont de forme et de grosseur variables. Les galles sont d'abord fermes (intérieur plein) et blanches, puis brunissent et se craquellent, puis pourrissent. La dégradation du système racinaire entraîne la mort de la plante dans la majorité des cas. Les symptômes observés sur les parties aériennes vont du flétrissement temporaire du feuillage, au cours de chaudes journées, à un défaut de croissance et à un rougissement des plantes infectées. Avant l'apparition des symptômes sur feuilles, la maladie peut déjà avoir progressé considérablement dans les racines.
(*Source texte et photo* : Terres-Inovia).

- **Les facteurs favorables sont :**
  - Des sols limoneux à pH acide, hydromorphe et battant ;
  - Des températures comprises entre 20-25°C et une humidité relative du sol supérieure à 80%. Les forts orages et l'irrigation sont des facteurs aggravants en cas de présence de hernie ;
  - Le retour fréquent du colza dans la rotation mais aussi l'implantation de crucifères comme CIPAN (Culture Intermédiaire Piège à Nitrate) ;
  - Un mauvais désherbage, notamment des crucifères, et le maintien des repousses de colza après la récolte ;
  - D'autres facteurs favorisent également le développement de la maladie : semis précoce, mauvais drainage de la parcelle ou l'absence de chaulage pour les sols acides ;

Attention à la dissémination de la hernie ! Les outils de travail du sol souillés dans une parcelle infestée sont des vecteurs potentiels de la hernie, tout comme des végétaux contaminés, de l'eau d'irrigation ou des fumiers contaminés. (*Source texte* : Terres-Inovia).
Plus de détails sur le pathogène, consultez sa fiche sur le site de Terres-Inovia. Fiche hernie des crucifères.
Dans le BSV de cette semaine, aucun cas n'a été recensé. Si vous observez ou avez des parcelles touchées par la hernie des crucifères, n'hésitez pas à remonter l'information en remplissant l'enquête menée par Terres-Inovia ci-contre. Enquête Hernie

PROCHAIN BSV : MARDI 1er DECEMBRE 2026

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées eux-mêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin a été réalisées par les partenaires suivants :
AGRIAL, AGRITECH SERVICE, ARVALIS, COOP GARUN-PAYSANNE, CRA BRETAGNE, EUREDEN, FREDON BRETAGNE, INNOVAL.

Rédigé par : FREDON Bretagne, 5, Rue A. de St Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD.
Animateur Grandes Cultures—Damien Leclercq. Tél : 07 63 57 60 84

Direction de Publication : Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne, ZAC Atalante Champeaux 35 042 RENNES.
Contact : Françoise MAHEO. Animatrice inter-filières - Tél : 02 97 46 22 63

Comité de Relecture :
Arvalis, Chambres d'Agriculture de Bretagne, DRAAF-SRAL, FREDON Bretagne, Terres Inovia.

Vous pouvez retrouver l'ensemble des BSV Grandes Cultures sur les sites internet suivants :
La FREDON Bretagne : https://fredon-bretagne.com/
La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne : https://bretagne.chambres-agriculture.fr/
La DRAAF Bretagne : https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/

Pour recevoir gratuitement les BSV : inscrivez-vous sur le site de FREDON Bretagne : Formulaire d'inscription
Ou inscrivez-vous sur le site de la chambre d'agriculture de Bretagne : Formulaire pour envoi de mail.